

تحلیل پاسخ‌های رتبه‌ای طولی با گم‌شدگی غیریکنوا در بررسی اثر درمان جامع بر عملکرد بیماران مبتلا به سایکوز

پریسا رضاقزاد اصل^۱، مصطفی حسینی^۲، سمانه افتخاری^۳، محمود محمودی^۴، کرامت الله نوری^۵

^۱ کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

^۲ استاد گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

^۳ استادیار گروه ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، ایران

^۴ استاد گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

^۵ داشیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

نویسنده رابط: کرامت الله نوری، نشانی: تهران، میدان انقلاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، تلفن: ۰۶۶۴۹۵۸۵۹، آدرس پست الکترونیک:

nourik@tums.ac.ir

تاریخ دریافت: ۹۲/۹/۲۴؛ پذیرش: ۹۳/۲/۶

مقدمه و اهداف: از مطالعات طولی برای بررسی تأثیر درمان در بسیاری از تحقیقات روان‌شناسی و روان‌پزشکی استفاده می‌شود.

مهم‌ترین مشخصه مطالعات طولی، اندازه‌گیری‌های مکرر از بیماران در طول زمان می‌باشد، نظر به این که مشاهده‌های مربوط به یک بیمار از یکدیگر مستقل نیستند؛ بنابراین برای تحلیل این داده‌ها باید از روش‌های ویژه آماری استفاده شود. همچنین داده‌های گم‌شدۀ جزء اجتناب ناپذیر اغلب مطالعات طولی می‌باشند که بر اثر بی‌پاسخی واحد نمونه‌گیری رخ می‌دهند. از آن جایی که گم‌شدگی منجر به کاهش دقت محاسبات آماری و ایجاد اربیبی در نتایج حاصل می‌شود، بررسی روش‌های برخورد با آن اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر درمان جامع بر عملکرد اجتماعی-فردى بیماران مبتلا به مرحله اول سایکوز با استفاده از روش‌های آماری مناسب می‌باشد.

روش کار: داده‌های این مطالعه از یک کارآزمایی بالینی و مربوط به بیمارانی است که در سال‌های ۱۳۸۵-۸۷ به درمانگاه‌ها یا اورژانس روان‌پزشکی بیمارستان روزبه مراجعه کرده‌اند. برای تحلیل پاسخ‌های رتبه‌ای طولی با گم‌شدگی غیریکنوا این مطالعه از مدل ضرایب تصادفی در نرم افزار R نسخه ۲،۱۵،۰ استفاده کردیم.

نتایج: نتایج برآوردهای مدل ضرایب تصادفی با پاسخ‌های گم‌شدۀ غیریکنوا و در نظر گرفتن مکانیسم گم‌شدگی تصادفی، نشان می‌دهد، درمان جامع با پیگیری در منزل، سن و سابقه‌ی بیماری در خانواده اثر معنی‌داری بر عملکرد اجتماعی-فردى بیماران دارند. برآوردهای ضریب متغیر سن و خطای معیار آن به ترتیب ۰/۰۵ و ۰/۰۳، برآوردهای ضریب متغیر سابقه‌ی بیماری ۰/۸۲ و خطای معیار آن ۰/۴۱ می‌باشد و ضریب متغیر درمان جامع با پیگیری در منزل ۱/۰۴ و خطای معیار آن ۰/۴۴ برآورده شد.

نتیجه‌گیری: مدل به کار گرفته شده در این مطالعه، نشان می‌دهد که درمان جامع با پیگیری در منزل، مناسب‌تر است. زیرا افراد تحت این نوع درمان شанс بیشتری برای داشتن عملکرد اجتماعی-فردى بیشتر دارند.

وازگان کلیدی: مطالعه طولی، داده‌های گم‌شدۀ، پاسخ رتبه‌ای، مدل ضرایب تصادفی، مرحله اول سایکوز

مقدمه

در انجام تحقیقات روان‌شناسی و روان‌پزشکی مطالعات طولی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. حتی در شرایط به خوبی کنترل شده، داده‌های گم شده در این مطالعات رخ می‌دهند (۱) در مطالعات طولی می‌توان اثر مداخله را بر متغیر پاسخ بررسی کرد (۲). مطالعه اندازه گیری‌های مکرر مطالعه‌ای است که در آن مشخصه‌های یکسان در دفعات مختلف اندازه گیری می‌شوند (۳). اگر مشخصه‌های یکسان به طور تکراری در طول زمان اندازه گیری شوند، داده‌های طولی خواهیم داشت، پاسخ‌ها برای افراد یکسان در زمان‌های مختلف هم‌بسته‌اند و این هم‌بستگی باید در تحلیل‌ها

گم شدگی اعم از الگوی کلی و الگوی انصراف یا یکنوا را نتیجه می‌دهد (۱۲). در الگوی کلی هیچ روند خاصی از گم شدگی مشاهده نمی‌شود و مقادیر گم شده در هر زمانی می‌تواند رخ دهد. اما در الگوی انصراف، بعد از این که شخص در یکی از موقعیت‌های اندازه‌گیری شرکت نکرد، دیگر به مطالعه باز نمی‌گردد (۱۰).

روبین (۱۱) در ۱۹۷۶ میلادی، برای اولین بار به فرمول‌بندی مفهوم مکانیسم گم شدگی در تحلیل داده‌ها پرداخت. مکانیسم گم شدگی به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:

مکانیسم گم شدگی کاملاً تصادفی (MCAR):^۷ که گم شدگی از مقادیر داده‌ها مستقل است. البته این امر به معنای تصادفی بودن الگوی گم شدن نمی‌باشد. بلکه تنها متذکر می‌شود که گم شدن به مقادیر موجود در متغیر دارای مقادیر گم شده وابسته نمی‌باشد. به عبارتی مقادیر گم شده یک نمونه تصادفی ساده از کل مقادیر متغیر مورد علاقه می‌باشند.

مکانیسم گم شدگی تصادفی (MAR):^۸ اگر گم شدگی فقط به قسمت مشاهده شده‌ی داده‌ها بستگی داشته باشد و نه به مقادیر

گم شده از داده‌ها، مکانیسم گم شدگی را تصادفی می‌نامند.

مکانیسم گم شدگی غیر تصادفی (NMAR):^۹ اگر گم شدگی علاوه بر مقادیر مشاهده شده، به مقادیر گم شده نیز وابسته باشد، مکانیسم گم شدگی را غیر تصادفی یا غیر قابل چشمپوشی نامیده می‌شود.

پاسخ‌ها برای افراد یکسان در زمان‌های مختلف هم‌بسته‌اند و این هم‌بستگی باید در تحلیل‌ها در نظر گرفته شود. برای تحلیل داده‌های طولی سه مدل اصلی برای در نظر گرفتن هم‌بستگی بین پاسخ‌ها وجود دارد که عبارتند از: مدل‌های انتقالی، مدل‌های ضرایب تصادفی و مدل‌های حاشیه‌ای (۱۳). این سه روش از نظر برخورده با هم‌بستگی‌های میان مشاهدات متفاوتند. مدل‌های دارای ضرایب تصادفی، هم‌بستگی مشاهدات را با معرفی یک یا چند متغیر پنهان، به حساب می‌آورند. تحلیل داده‌های رتبه‌ای برای نخستین بار توسط McCullagh در سال ۱۹۸۰ میلادی با معرفی رگرسیون لوژستیک رتبه‌ای برای اثرات ثابت مطرح شد (۱۴). یک مدل لوجستیک ترتیبی دارای عرض از مبدأ تصادفی به صورت زیر تعریف می‌شود: (۱۵)

وسیله ضرایب رگرسیونی متفاوت در افراد مختلف در نظر گرفته می‌شود (۹).

داده‌های گم شده جزء اجتناب‌ناپذیر مطالعات طولی است. در مطالعات طولی مواجه با داده‌های گم شده بسیار پیچیده‌تر از مطالعات مقطعی است، زیرا که الگوی گم شدن داده‌ها پیچیده‌تر است و بی‌پاسخی می‌تواند در هر زمانی رخ دهد. در مطالعات طولی داده‌های گم شده به دو دسته ۱) الگو گم شدگی غیر یکنوا یا کلی^۱، ۲) الگوی انصراف^۲ تقسیم می‌شوند (۱۰) مکانیسم گم شدگی^۳ که بیانگر رابطه‌ی گم شدگی با مقادیر متغیرهاست، مسئله مهم دیگر در بی‌پاسخی‌ها است. نقش اساسی مکانیسم گم شدگی در تحلیل داده‌ها اولین بار با فرمول‌بندی این مفهوم در تحلیل داده‌ها توسط روبین (۱۱) در ۱۹۷۶ مطرح شد. مکانیسم گم شدگی‌گی شامل سه دسته ۱) گم شدگی کاملاً تصادفی، ۲) گم شدگی تصادفی^۴، و ۳) گم شدگی غیر تصادفی^۵ می‌باشد.

ساکوز مجموعه‌ای از عالیم است که در بیماری‌ها و اختلالات مختلف دیده می‌شود و معمولاً این افراد واقعیت را نسیی می‌بینند و در ارتباط با جهان واقع دچار اختلال می‌شوند. اختلالات سایکوتیک در میان اختلالات مختلف روانپردازی، چه به لحاظ مشکلات فردی و خانوادگی و چه از نظر عاقب اقتصادی اجتماعی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. شایع ترین آن‌ها اسکیزوفرنی و اختلالات خلقی سایکوتیک هستند که اغلب از دوران جوانی آغاز می‌گردد و معمولاً با صرف هزینه‌های زیاد درمانی و پیش‌آگهی نه چندان خوب همراهند.

هدف از این مطالعه استفاده از مدل ضرایب تصادفی برای پاسخ‌های رتبه‌ای طولی با گم شدگی غیر یکنوا و مکانیسم گم شدگی تصادفی برای بررسی اثر درمان جامع بر عملکرد اجتماعی- فردی بیماران مبتلا به سایکوز مرحله اول بود.

روش کار

در بسیاری از مطالعات با پاسخ‌هایی مواجهه پیدا می‌شود که بخشی از آن‌ها گزارش نشده‌اند. پاسخ مربوط به یک فرد ممکن است در یک دوره پیگیری گم شود، و سپس در دوره‌ی بعدی مورد اندازه‌گیری قرار گیرد، که این امر الگوهای بسیار متنوعی از

^۱ Nonmonotone Missing Pattern

^۲ Monotone Missing Pattern

^۳ Missing Data Mechanism

^۴ Missing Completely at Random

^۵ Missing at Random

^۶ Not Missing at Random

تشخیص بالینی وضعیت فعلی و اختلالات موجود را مشخص می‌ساخت. سپس بیماران وارد یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار شدند و به صورت غیر تصادفی و با نظر پزشک غربالگر در یکی از گروههای مداخله و کنترل قرار گرفتند. درابتدا در هر دو گروه مداخله (گروه تحت درمان جامع) و کنترل (گروه تحت درمان رایج) ۵۰ نفر قرار گرفتند که با توجه به این‌که برخی از بیماران حاضر به ادامه همکاری نشدند و پس از ریزش تعدادی از افراد مورد مطالعه در نهایت، ۳۲ نفر در گروه مداخله و ۳۹ نفر در گروه کنترل باقی ماندند. گروه مداخله (۳۲ نفر) برای دریافت درمان جامع به بیمارستان روزبه ارجاع می‌شدند و سپس این گروه بیماران با توجه به تشخیص بالینی تحت پروتکل درمانی ویژه‌ای قرار گرفتند که توسط طراحان مطالعه بر اساس پروتکل EPPIC (۱۶) تنظیم شده بود و شامل درمان دارویی، آموزش به بیمار و خانواده و پیگیری فعال برای پایش و ویزیت مجدد بیمار (پیگیری بیمار به صورت تلفنی (۱۶ نفر)) یا ویزیت در منزل (۱۶ نفر) می‌شد. طی این آموزش‌ها فرد بیمار و خانواده او در مورد علایم خطر سایکوز و نشانه‌های عود، آگاهی لازم را پیدا می‌کنند تا در اولین فرصت بتوانند اقدامات لازم درمانی را انجام دهند. گروه شاهد (۳۹ نفر) تحت درمان‌های رایج در بیمارستان روزبه برای بیماران ابیزود اول سایکوز قرار گرفتند و هیچ مداخله‌ای در روند درمان پزشکان معالج داده نمی‌شد. این درمان‌ها عمدتاً دارویی بود، اما پیگیری فعال و پیگیری در منزل وجود نداشت و بیماران در صورت نیاز در بخش بسترهای این درمان می‌شدند و ویزیت‌های پیگیری در درمانگاه بیمارستان انجام می‌شد.

همه‌ی بیماران در ماههای ۱۲، ۱۸ و ۲۴ پس از مراجعتی اول از نظر عملکرد اجتماعی- فردی ارزیابی شدند. عملکرد Global Assessments of Functional (GAF) بر اساس Scale (۱۷)، یک مقیاس عددی بین ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد، که بنا بر دیدگاه طیفی بر پایه سلامتی و بیماری روانی بنا نهاده شده است، که در آن ۱۰۰ نشان دهنده بالاترین عملکرد در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی، شغلی و روان‌شناسختی است و هر چه نمره فرد پایین‌تر باشد، نشان دهنده اختلال بیشتری در عملکرد وی است. در این مطالعه میزان عملکرد بیماران با معیار رتبه‌ای به صورت =۰ (نمره زیر ۳۰) اختلال شدید؛ =۱ (نمره بین ۳۰-۶۰) اختلال متوسط؛ و =۲ (نمره بالاتر از ۶۰) بدون اختلال بیان شده است.

$$\log itP(Y_{it} \leq j | u_i) = \log\left(\frac{P(Y_{it} \leq j | u_i)}{1 - P(Y_{it} \leq j | u_i)}\right)$$

$$= a_j + u_i + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{ik}$$

که در آن Y_{it} پاسخ واحد ا- ام در زمان + که دارای $J=1, \dots, J$ طبقه می‌باشد، X_{ik} متغیر کمکی k- ام برای واحد ا- ام و u_i عرض از مبدأ تصادفی برای واحد ا- ام با توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس σ^2 است، معرفی چنین ضریب تصادفی، به معنای تفاوت عرض از مبدأ مدل برای افراد متفاوت است، یعنی عرض از مبدأ ا- امین فرد، a_1+u_1 است. برآورد حداقل درستنمایی مشتق شده از چگالی چند جمله‌ای با احتمالات $P(Y_{it} = j | X_i)$ می‌باشد. توزیع توانم پاسخ‌ها برای هر واحد در یک مدل ضریب تصادفی به صورت زیر نتیجه می‌شود:

$$f(Y_i | X_i, u_i) = \int \prod_{t=1}^T P(Y_{it} = y_{it} | X_i, u_i) f(u_i) du_i$$

که در آن پاسخ‌ها در هر زمان برای واحد ا- ام به شرط ضرایب تصادفی، مستقل از یکدیگر فرض می‌شوند. این انتگرال فرم بسته‌ای ندارد و برای حل این انتگرال از روش‌های محاسباتی دیگر استفاده می‌شود.

با توجه به این‌که مکانیسم گم‌شدن گاملاً تصادفی فرض گردید، در نتیجه از داده‌های گم شده صرف‌نظر شد.

برای بررسی اثر درمان جامع بر عملکرد اجتماعی-فردی بیماران مرحله اول سایکوز، در یک مطالعه با ۷۱ بیمار مبتلا به اولین اپیزود اختلالی سایکوتیک (خلقی یا غیر خلقی) که در سال ۱۳۸۵ به درمانگاه‌ها یا اورژانس روانپزشکی بیمارستان روزبه مراجعه کرده بودند، مدل فوق به کار برد شد. انتخاب بیماران به صورت نمونه گیری غیرتصادفی و دسترس بود و افرادی که بیش از دو هفته قبل از مراجعت، درمان آنتی‌سایکوتیک دریافت کرده بودند، بیمارانی که دچار نقص شدید ارتیباطی یا عقب‌ماندگی ذهنی بودند و افرادی که یک بیماری جدی ارگانیک داشتند، از مطالعه خارج شدند. به دلیل نیاز به پیگیری لازم بود این بیماران ساکن تهران باشند و برای آن‌ها محدوده سنی وجود نداشت.

بعد از انتخاب بیمار به عنوان نمونه و توضیح اهداف طرح و دریافت رضایت کتبی آگاهانه از بیمار و خانواده وی، در ابتدا پرسشنامه مربوط به مشخصات دموگرافیک و متغیرهای خاص مانند سابقه بیماری در خانواده و... توسط پزشک تکمیل می‌شد. سپس روانپزشک همکار طرح بر اساس معیارهای DSM-IV

یافته‌ها

استفاده از تحلیل این داده‌ها در نرم‌افزار R نسخه ۲,۱۵,۰ به دست آمده، را در جدول شماره ۳ مشاهده می‌کنید. با توجه به جدول درمان جامع با پیگیری در منزل و سن و سایقه بیماری در خانواده اثر معنی‌داری بر عملکرد اجتماعی- فردی بیماران داشتند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط شناس داشتن عملکرد کلی کمتر برای بیماران تحت درمان جامع با پیگیری در منزل $0/35$ برابر افراد تحت درمان رایج و برای بیماران تحت درمان جامع با پیگیری تلفنی $1/27$ برابر بیماران تحت درمان رایج می‌باشد. همچنین با توجه به نسبت شناس عملکرد کلی کمتر به عملکرد بیشتر با فرض ثابت بودن سایر شرایط $(10/05)$ برای بیماران به ازای یک واحد افزایش در سن افزایش می‌یابد و شناس برآورده شده برای این که عملکرد کلی بیمار با سابقه بیماری در خانواده در جهت عملکرد کمتر باشد، به جای این که در جهت عملکرد بیشتر باشد، $0/44$ برابر بیمار بدون سابقه بیماری در خانواده می‌باشد.

میانگین و انحراف معیار سن افراد $34/68 \pm 9/09$ سال بود. $46/64/79$ (درصد) بیمار مرد و $25/35/21$ (درصد) بیمار زن، $50/70/42$ (درصد) بیمار مجرد و $21/29/58$ (درصد) بیمار متاهل، میزان تحصیلات $56/78/87$ (درصد) بیمار زیر دیپلم و $15/21/13$ (درصد) بیمار بالای دیپلم، $12/16/90$ (درصد) بیمار شاغل و $59/83/10$ (درصد) بیمار بیکار، $41/57/75$ (درصد) بیمار دارای سابقه بیماری در خانواده بودند. توزیع فراوانی عملکرد اجتماعی- فردی بیماران مبتلا به اپیزود اول سایکوز در زمان‌های پیگیری و به تفکیک گروه‌های درمانی در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود. توزیع فراوانی مشخصات پایه بیماران مبتلا به اپیزود اول سایکوز به تفکیک گروه درمان در جدول شماره ۲ آمده است.

نتایج برآورد پارامترهای مدل دارای ضرایب تصادفی با پاسخ‌های گم شده غیر یکنوا و در نظر گرفتن مکانیسم گم شدگی تصادفی با

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی عملکرد اجتماعی- فردی بیماران مبتلا به اپیزود اول سایکوز در زمان‌های پیگیری به تفکیک گروه درمان

زمان پیگیری	گروه درمان جامع یا پیگیری تلفنی												گروه درمان رایج											
	گروه درمان جامع یا پیگیری تلفنی						گروه درمان رایج						گروه درمان رایج						گروه درمان رایج					
	عملکرد خوب	عملکرد متوسط	عملکرد ضعیف	عملکرد خوب	عملکرد متوسط	عملکرد ضعیف	عملکرد خوب	عملکرد متوسط	عملکرد ضعیف	عملکرد خوب	عملکرد متوسط	عملکرد ضعیف	عملکرد خوب	عملکرد متوسط	عملکرد ضعیف	عملکرد خوب	عملکرد متوسط	عملکرد ضعیف	عملکرد خوب	عملکرد متوسط	عملکرد ضعیف	عملکرد خوب	عملکرد متوسط	
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۱۸/۷۵	۳	۶۲/۵	۱۰	۱۸/۷۵	۳	۳۱/۲۵	۵	۶۲/۵	۱۰	۶/۲۵	۱	۱۵/۳۸	۶	۶۶/۶۷	۲۶	۱۷/۹۵	۷	اول						
۲۵	۳	۶۶/۶۷	۸	۸/۳۳	۱	۳۳/۳۳	۴	۵۸/۳۳	۷	۸/۳۳	۱	۴۲/۸۶	۶	۴۲/۸۶	۶	۱۴/۲۹	۲	دوم						
۳۶/۲۶	۴	۶۳/۴۶	۷	۰	۰	۴۴/۴۴	۴	۴۴/۴۴	۴	۱۱/۱۱	۱	۲۱/۰۵	۴	۳۶/۸۴	۷	۴۲/۱۱	۸	سوم						
۲۰	۲	۶۰	۶	۲۰	۲	۱۲/۵	۱	۶۲/۵	۵	۲۵	۲	۴۶/۶۷	۷	۴۰	۶	۱۳/۳۳	۲	چهارم						
۶۰	۶	۳۰	۳	۱۰	۱	۸/۲۳	۱	۵۸/۳۳	۷	۳۳/۳۳	۴	۴۰/۹۱	۹	۳۶/۳۶	۸	۲۲/۷۳	۵	پنجم						

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی مشخصات پایه بیماران مبتلا به اپیزود اول سایکوز به تفکیک گروه درمان

گروه درمان			نام متغیر
=۱=درمان رایج	=۲=درمان جامع با پیگیری تلفنی	=۳=درمان جامع با پیگیری در منزل	
۳۳/۸۷±۷/۶۴	۳۴/۰۶±۱۰/۰۵	۳۷/۲۵±۱۰/۸۵	سن
۲۴(۶۲)	۱۱(۶۹)	۱۱(۶۹)	مرد
۱۵(۳۸)	۵(۳۱)	۵(۳۱)	زن
۲۵(۶۴)	۱۲(۷۵)	۱۲(۷۵)	مجرد
۱۴(۳۶)	۴(۲۵)	۴(۲۵)	متاهل
۳۴(۸۷)	۱۲(۷۵)	۱۰(۶۲)	زیر دیپلم
۵(۱۲)	۴(۲۵)	۶(۳۸)	بالای دیپلم
۵(۱۲)	۴(۲۵)	۳(۱۹)	شاغل
۳۴(۸۷)	۱۲(۷۵)	۱۳(۸۱)	بیکار
۲۵(۶۴)	۷(۴۴)	۹(۵۶)	ندارد
۱۴(۳۶)	۹(۵۶)	۷(۴۴)	دارد

*سن به صورت میانگین \pm انحراف معیار گزارش شده است.

*متغیرهای کیفی به صورت تعداد (درصد) گزارش شده است.

جدول شماره ۳- برآورد پارامترها در مدل ضرایب تصادفی با گم شدگی تصادفی غیریکنوا در متغیر پاسخ

متغیر					
درمان جامع با پیگیری تلفنی	درمان جامع با پیگیری در منزل	درمان رایج	درمان	سن*	
۰/۲۴	-۱/۰۴	۰/۰۵	۰/۲۴	۰/۱۲۷	برآورد نسبت شانس
-۱/۰۴	۰/۴۴	-۰/۳۳	-۰/۰۴	۰/۳۵	برآورد نسبت شانس
۰/۰۳	۰/۵۲	۰/۰۳	۰/۰۳	(۰/۰۵)	فاصله اطمینان
۰/۰۳	۰/۵۲	۰/۰۳	۰/۰۳	(۰/۰۵)	خطای معیار
۰/۰۳	۰/۵۲	۰/۰۳	۰/۰۳	(۰/۰۵)	برآورد ضریب
۰/۰۳	۰/۵۲	۰/۰۳	۰/۰۳	(۰/۰۵)	برآورد ضریب
۰/۰۳	۰/۵۲	۰/۰۳	۰/۰۳	(۰/۰۵)	فاصله اطمینان
۰/۰۳	۰/۵۲	۰/۰۳	۰/۰۳	(۰/۰۵)	برآورد نسبت شانس
۰/۰۳	۰/۵۲	۰/۰۳	۰/۰۳	(۰/۰۵)	فاصله اطمینان
۰/۰۳	۰/۵۲	۰/۰۳	۰/۰۳	(۰/۰۵)	برآورد نسبت شانس
۰/۰۳	۰/۵۲	۰/۰۳	۰/۰۳	(۰/۰۵)	متغیر
۰/۰۳	۰/۵۲	۰/۰۳	۰/۰۳	(۰/۰۵)	

کامل با در نظر گرفتن مکانیسم گم شدگی کاملاً تصادفی با
الگویی غیریکنوا، امکان بررسی به طور همزمان متغیرها در طول
زمان را بدون از دست دادن اطلاعات ایجاد می‌کند. بنابراین در
این مطالعه، با استفاده از مدل ضرایب تصادفی با وجود مقادیر گم

بحث

داده‌های گم شده یک مشکل عمدۀ در مجموعه داده‌ها به
خصوص در مطالعات طولی می‌باشد. تابع درست‌نمایی مشاهدات

رفع اختلالات همراه مانند افسردگی، مانیا، علایم منفی، اضطراب، مصرف مواد مخدر گردد؛ این در حالی است که همراهی سایکوز با سایر اختلالاتی مانند مصرف مواد، افسردگی، افکار خودکشی و PTSD^۲ در این دوره شایع است و توجه به این مشکلات چه از نظر مشکلات مربوط به خود آنها و چه به لحاظ تنفس زا بودن برای عود سایکوز بسیار دارای اهمیت است (۲۴). از این‌رو ادامه‌ی مراقبت و درمان و کنترل عوامل خطرساز در این دوره می‌تواند پیش‌آگهی بیماری را در باقی عمر بیمار تغییر دهد.

لارسن و همکاران (۱۹) در یک مطالعه نشان دادند که بیماران مرد به طور معنی‌داری فراوانی بیشتر در وضعیت تجربه، سطح تحصیلات پایین‌تر و سن کمتر در شروع بیماری بودند. کوبیک و همکاران (۲۵) در کشور ژاپن در مطالعه‌ای با استفاده از مدل رگرسیون نشان داده شد که درمان مداخله‌ای زودهنگام برای بیماران مبتلا به نخستین دوره سایکوز در مقایسه با درمان‌های عادی مناسب‌تر است. در یک مطالعه مروری که توسط اکوا و همکاران (۲۶) نشان دادند که عملکرد اجتماعی و پاسخ به درمان در زنان بیش‌تر از زنان و بروز اسکیزوفرنیا و نخستین دوره سایکوز در زنان کمتر از مردان می‌باشد.

نتیجه‌گیری

مدل به کار گرفته شده در این مطالعه، نشان می‌دهد که درمان جامع با پیگیری در منزل، مناسب‌تر است. زیرا افراد تحت این نوع درمان شناس بیش‌تری برای داشتن عملکرد اجتماعی - فردی مناسب‌تر دارند. امید است که یافته‌های این مطالعه در شناخت بهتر وضعیت درمانی این بیماران و انتخاب مناسب روش درمان موثر واقع شود.

تشکر و قدردانی

نگارندگان بر خود لازم می‌دانند از آقای دکتر ونداد شریفی و خانم دکتر زهرا شهریور در گروه آموزشی بیمارستان روزبه، جهت همکاری در این پژوهش، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.

شده در متغیر پاسخ رسته‌ای به بررسی اثر درمان جامع بر عملکرد اجتماعی- فردی بیماران مبتلا به سایکوز مرحله اول پرداخته شد. در این مدل، اثر متغیرهای درمان جامع با پیگیری در منزل، سن و سابقه بیماری در خانواده معنی‌دار گردید (فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای متغیر گروه درمان جامع با پیگیری در منزل ۹۵ (۲/۲۴)، ۰۰/۱۶) فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای متغیر سن (۰/۱۱) و فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای متغیر سابقه بیماری در خانواده (۰/۰۱، ۱/۶۴). بنابراین با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر، بیمارانی که تحت درمان جامع با پیگیری در منزل قرار گرفتند، در طی زمان مطالعه عملکرد کلی بیشتری نسبت به بیماران در گروه کنترل داشتند و تفاوتی در عملکرد کلی بیمارانی که تحت درمان جامع با پیگیری تلفنی قرار گرفتند و بیمارانی که درمان رایج دریافت کردند، مشاهده نشد.

ایده‌ی مداخله‌ی به موقع و زود هنگام در شروع علایم سایکوز دریچه‌های امیدی به سوی بهبود بخشیدن این عواقب و بهتر نمودن سیر بالینی گشوده است. معمولاً سایکوز طی ۱-۲ سال اول تشخیص داده نشده و با پیشرفت بیماری طی این دوره همراه است (۱۸) در حالی که تشخیص به موقع موجب افزایش پاسخ‌دهی، کاهش عود و بهتر شدن کیفیت زندگی می‌شود (۱۹). در مطالعه دیگری که در سال ۱۹۸۶ میلادی توسط کرو^۱ و همکاران در مورد اثر دوره وجود سایکوز پیش از شروع درمان انجام شده این یافته به دست آمده که در بیمارانی که شروع علایم با شروع درمان بیش از یک سال فاصله داشته است؛ به طور معنی‌داری عود طی ۲ سال اول بالاتر از گروه دیگر با فاصله‌ی کمتر از یک سال بین شروع علایم و شروع درمان بوده است (۲۰). حتی اگر پاسخ به درمان پس از به تأخیر افتادن شروع مداخله‌های درمانی همچنان بالا باشد، مداخله‌های انسانی و پزشکی ایجاب می‌کند که درمان صحیح در اولین زمان ممکن برای بیماران جوانی که از علایم سایکوز رنج می‌برند، آغاز گردد (۲۱). اهمیت این موضوع در دوران کودکی و نوجوانی مضاعف است، زیرا اولاً سطح آگاهی و میزان توجه عموم نسبت به بهداشت روان در این دوران بسیار پایین است، ثانیاً تنوع و پیچیدگی سایکوزها در سنین خردسالی، تشخیص و درمان به موقع را دشوار می‌سازد (۲۲)، اما شناسایی بیماران در اوایل بیماری و تشخیص به موقع تنها هنگامی ارزشمند است که درمان مؤثر قابل ارایه باشد (۲۳). درمان مؤثر درمانی است که موجب رفع علایم مثبت بیماری و نیز

منابع

1. Hedeker D, Gibbons RD. Application of Random-Effect Pattern-Mixture Models for Missing Data in Longitudinal Studies. American Psychological Association, 1997; 2: 64-78.
2. Turney EA, Amara IA, Koch GG, Stewart WH. Evaluation of alternative statistical methods for linear model analysis to compare two treatments for 24-hour blood pressure response. Stat Med. 1992; 11: 1843-60.
3. Johnson RA, Wichern DW. Applied Multivariate Statistical Analysis. Englandwood Cliffs, NJ:Prentic Hall, 1992.
4. Todem D, Kim K, Lesaffre E. Latent-variable models for longitudinal data with bivariate ordinal outcomes. Stat Med. 2007; 25: 1034-54.
5. Tutz G. Modeling of Repeated Ordered Measurements by Isotonic Sequential Regression. Statistical Modeling, 2005; 4: 269-78.
6. Tutz G, Hennevogl W. Random Effects in Ordinal Regression Models. Computational Statistics and Data Analysis, 1996; 537-57.
7. Verbeke G, Lesaffre E. A Linear Mixed-Effects Model with Heterogeneity in Random-Effects Population. Journal of the American Statistical Association, 1996; 217-21.
8. Bridge DM, Dos Santos DM. Fitting a Random Effects Model to Ordinal Recurrent Events Using Existing Software. Statistical Computation and Simulation, 1996; 73-86.
9. Ware JH. Linear Models for Analysis of Longitudinal Studies. The American Statistician, 1985; 95-111.
10. Ibrahim JG, Molenberghs G. Missing data methods in longitudinal studies: a review. Test (Madr), 2009; 18: 1-43.
11. Little R, Rubin B. Statistical Analysis With Missing Data. New York: Hoboken, NJ : Wiley.2002;2th ed. 143-47.
12. Fitzmaurice G, Davidian M. Longitudinal data analysis. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2009. 327-42.
13. Fahrmeir L, Tutz G. Multivariate statistical modelling based on generalized linear models. Springer-Verlag, 1994;2th ed. 432-7.
14. McCullagh P. Regression models for ordinal data. Royal Statistical Society Series B.1980; 42:109-42.
15. Agresti A. Categorical data analysis. Wiley-Interscience, Department of Statistics. University of Florida. 2002;2th ed. 215-30.
16. McGorry PD, Edwards J, Mihalopoulos C, Harrigan SM. EPPIC: an evolving system of early detection and optimal management. Schizophr Bull, 1996; 22: 305-26.
17. Sadock BJ, Sadock VA, Kaplan HL. Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry. 9th ed. 2003, Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins. 1460.
18. Norman RMG, Malla AK. Duration of untreated psychosis: a critical examination of the concept and its importance. Psychological Medicine. 2001; 31: 381-400.
19. Larsen TK, McGlashan TH, Moe LC. Moe. First-episode schizophrenia 1. Early course parameters. Schizophrenia Bulletin. 1996; 22: 241-56.
20. Johnstone EC, Crow TG, Johnson AL, MacMillan JF. The Northwick Park Study of first episodes of schizophrenia. I. Presentation of the illness and problems relating to admission. Br J Psychiatry. 1986;148: 115-20.
21. Ho BC, Andreasen NC, Flaum M, Nopoulos P, Miller D. Untreated initial psychosis: its relation to quality of life and symptom remission in first-episode schizophrenia. Am J Psychiatry. 2000;157: 808-15.
22. Alaghbandrad J, Mckenna K, Gordon CT. Childhood-Onset Schizophrenia - the Severity of Premorbid Course. Biological Psychiatry. 1995; 37: 625-35.
23. Falloon IR, Coverdale JH, Laidlaw TM, Merry S, Kydd RR, Morosini P. Early intervention for schizophrenic disorders- Implementing optimal treatment strategies in routine clinical services. British Journal of Psychiatry, 1998;172: 33-8.
24. Birchwood M, Todd P, Jackson C. Early intervention in psychosis: the critical period hypothesis. Br J Psychiatry Supp, 1998; 172: 53-9.
25. Koik S, Nishida A, Yamasaki S, Ichihashi K, Maegawa S, Natubori T, et al. Comprehensive early intervention for patients with first-episode psychosis in Japan: Study protocol for randomized controlled trial. BioMed Central. 2011; 20; 12: 156.
26. Ochoa S, Usall J, Coba J, Labad X, Kulkani J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis:a comprehensive literature review. Schizophrenia research and treatment. 2012; 59-68.

Original Article

Analysis of Longitudinal Ordinal Responses with Non-Monotone Missingness in Evaluation of the Effect of Comprehensive Treatment on the Performance of Patients with Psychosis

Rezanejad Asl P¹, Hosseini M², Eftekhary S³, Mahmoodi Majd Abadi M⁴, Nouri K⁵

1- MSc student of Biostatistics, Biostatistician, Department of Biostatistics, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
 2- PhD, Biostatistician, Professor of Biostatistics, Department of Biostatistics, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
 3- PhD, Statistics, Assistant Professor of Mathematical Statistics, Department of Mathematics, Statistics and computer sciences, University of Tehran (UT), Tehran, Iran
 4- PhD, Biostatistician, Professor of Biostatistics, Department of Biostatistics, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
 5- PhD, Biostatistician, Associate Professor of Biostatistics, Department of Biostatistics, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

Corresponding author: Nouri K, Nouri4@yahoo.com

Background & Objectives: Longitudinal studies are used in many psychiatric researches to evaluate the effectiveness of treatment. The main characteristic of longitudinal studies is repeated measurements of the patients over time. Since observations from the same patient are not independent from each other, especial statistical methods must be used for analyzing the data. Missing data is an indispensable component in longitudinal. In this study, we examined the effect of comprehensive treatment on social-individual performance in patients with the first episode of psychosis.

Methods: The data was from a clinical trial involving patients who were admitted to the clinics of Rozbeh Hospital between 2006_2008. We employed a random effect model for the analysis of longitudinal ordinal responses with non-monotone missingness using the R software version 3.0.2.

Results: The results showed that comprehensive treatment with follow-up at home, age, and family history of the disease had a significant effect on the social-individual performance of the patients. The estimation of the coefficient of age and its standard deviation were 0.05 and 0.03, respectively. The estimation of the coefficient of family history of the disease was -0.82 with a standard deviation of 0.41, and the coefficient of comprehensive treatment with follow-up at home and its standard deviation, were estimated -1.04 and 0.44, respectively.

Conclusion: The model used in this study showed that the comprehensive treatment with follow-up at home was better because individuals under this type of treatment are more likely to have social-individual performance.

Keywords: Longitudinal study, Missing data, Order response, Random effect model, First-episode psychosis