

ویژگی‌های همه‌گیرشناسی و بالینی سردردهای میگرنی و تنși و برآورد شیوع در مراجعت به بیمارستان فارابی کرمانشاه، سال ۱۳۸۹-۹۰

بهروز بهروز^۱، کیانوش امینی^۲، فرحتناز شاکنیا^۳، احمد عابدی^۴، نظام الدین قاسمی^۵

^۱ کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

^۲ متخصص مغز و اعصاب، گروه نوروولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

^۳ کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

^۴ استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

^۵ دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

نویسنده رابط: بهروز بهروز، آدرس: کرمانشاه، سرپل ذهاب، تازه آباد، خ شهید باهنر، پلاک ۴۸۶۷، کد پستی: ۶۷۷۱۹۴۶۳۹، تلفن: ۰۹۱۸۵۵۲۲۰۶۲.

پست الکترونیک: Behrouz.psych064@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۳/۲۰؛ پذیرش: ۱۳۹۱/۳/۱۱؛ پذیرش:

مقدمه و اهداف: سردد یکی از شایع‌ترین عارضه‌هایی است که می‌تواند مشکلی جدی برای افراد، در هر گروه سنی، به وجود آورد.

پژوهش حاضر، با هدف برآورد شیوع سردردهای تنși و میگرنی، گزارش ویژگی‌های بالینی سردد و مقایسه آن‌ها با هم، صورت گرفت.

روش کار: پژوهش به روش مقطعی، روی ۱۱۵۰ بیمار مراجعه‌کننده با شکایت سردد، به بیمارستان فارابی کرمانشاه در سال‌های

۱۳۸۹-۹۰ انجام شد و در پایان، ۳۵۰ نفر به عنوان بیمار تشخیص داده شدند و فهرست طبقه‌بندی بین‌المللی سردد (IHS) را تکمیل

کردند. داده‌ها با استفاده از آماره‌های توصیفی فراوانی و درصد، با نرم‌افزار SPSS تحلیل شد.

نتایج: نتایج نشان داد که زنان بیشتر از مردان به سردد مبتلا بودند (۰/۰۰۰۱<P<۰/۰۰۰۱). همچنین، میگرن در گروه‌های سنی ۳۰-۴۱ سال، با

۵۴ نفر مبتلا (۰/۱۵/۴)، بیشتر شیوع داشت، اما سردد تنși در گروه‌های سنی ۴۲-۵۳ (۰/۲۳/۳)، شایع‌تر بود و

رابطه‌ای معنادار بین موقعیت و نوع سردد مشاهده شد (۰/۰۰۰۱<P<۰/۰۰۰۱). همچنین، پژوهش نشان داد که (۰/۰/۰۴) از مبتلایان به میگرن و

(۰/۰/۸۹) از مبتلایان به سردد تنși به علت سردد شغل خود را از دست داده بودند. و بین سردد تنși و سابقه درگیری در شغل دوم

رابطه‌ای معنادار وجود داشت (۰/۰/۲۶<P<۰/۰/۲۶).

نتیجه گیری: سردردهای تنși و میگرنی دو عارضه جدگانه‌اند و در ایجاد هر یک، دیگری کاملاً بتأثیر است. عارضه سردد توجه

بیشتر و ارائه راهکارهایی را می‌طلبد که با کمک آن‌هاروندی مناسب برای پیشگیری، تشخیص و درمان آن، در نظر گرفته شود.

وازگان کلیدی: سردد تنși، سردد میگرنی، مراجعت به بیمارستان فارابی

مقدمه

زنان ۹۹٪ گزارش شده است (۸). بیشتر سردردها از نوع میگرن (Tension Headaches) یا سردد تنși (Migraine Headaches) هستند. این سردردها می‌توانند خفیف و با فواصل نه چندان کم و یا شدید و دیرپا باشند. سردردهای شدید و تکرارشونده فعالیت‌های روزمره زندگی را محدود می‌سازند، کیفیت زندگی را می‌کاهند و باعث کاهش بهره‌وری می‌شوند (۱).

سردد تنși به عنوان شایع‌ترین سرددی که درمان آن دشوار است (۹)، با درد دو طرفه غیر ضربانی (فشار یا سفتی، درد کند، شبیه باندز یا کلاه)، درد خفیف یا متوسط که بتواتر مانع فعالیت‌های روزانه شود، تعریف می‌شود که عموماً از منطقه پس‌سری شروع می‌شود و در ناحیه پیشانی و گیجگاهی نیز وجود

سردد به عنوان یکی از رایج‌ترین شکایت‌ها در کلینیک‌های عصب‌شناخی (۱)، در اثر کشن، جابه‌جایی، التهاب، اسپاسم عروق و یا اتساع ساختمان‌های حساس به درد، در سر یا گردن ایجاد می‌شود (۲). این عارضه شایع‌ترین سندروم درد است (۳) و بیش از ۹۰٪ انسان‌ها در طول سال حداقل یک حمله سردد را تجربه می‌کنند (۴). سالانه ۲۴۰ میلیون نفر در سراسر جهان از ۱/۴ میلیارد حمله سردد رنج می‌برند (۵). همچنین، طبق بررسی‌های انجام‌شده در ایران، شایع‌ترین علت مراجعه بیماران به درمانگاه اعصاب و روان، سردد گزارش شده است (۶) که این وضعیت، سردد را به هدفی بزرگ برای مداخلات سلامتی تبدیل کرده است (۷). شیوع سردد در طول عمر، در مردان ۹۳٪ و در

۴/۲۴۵٪ بود (۳۰). در نایرویی، ۸۶٪ افراد سردد و ناتوانی درکارکدن به درجات مختلف داشتند و نیز، میگرن بیشتر بر کارکردن و فعالیت‌های اجتماعی آنان تأثیر داشت. ۶/۲۳٪ افراد مبتلا به سردد در یک سال گذشته حداقل یک روز هفته غیبت از کار به علت سردد داشتند و بین شدت سردد و تعداد روزهای غیبت از کار یا تحصیل رابطه‌ای معنی‌دار وجود داشت (۳۱). در پژوهشی دیگر، افزایش سن، جنس مؤنث، سطح اقتصادی- اجتماعی پایین، سطح تحصیلات پایین مادر، سابقه خانوادگی سردد و استرس، به عنوان عوامل مؤثر در افزایش شیوع سردد مطرح شدند (۲۳). در مطالعه‌ای روی دانشجویان دختر، افراد میگرنی به طور معنی‌دار یک یا بیش از یک خویشاوند درجه اول یا دوم میگرنی داشتند و در میگرن قاعده‌گی نیز این مسئله صادق بود و از سویی، در بین بستگان درجه اول، میگرن در مادران افراد مبتلا بیشتر از پدرانشان بود. بر این اساس، عوامل ژنیکی و هورمونی را در ایجاد میگرن مؤثر دانستند (۳۲). شیوع میگرن و سردردهای تنشی در مطالعه‌های انجام شده در ایران بدین قرار بوده است: ۷/۴٪ بین دانشجویان پزشکی شیراز (۳۳)، ۱۷/۱٪ بین دانشآموزان ابتدایی مدارس شیراز (۳۴)، ۱۰٪ و ۲۴٪ بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهر شیراز (۳۵) و شیوع میگرن بین دانشجویان پزشکی زنجان ۱۱٪ بود (۳۶). پژوهش حاضر، با هدف برآورد شیوع سردردهای میگرنی، تنشی و سردد توأمان میگرنی- تنشی، بین افراد مراجعه‌کننده با شکایت سردد به بیمارستان تخصصی فارابی شهر کرمانشاه (۹۰-۱۳۸۹)، تشخیص عوامل خطر شغلی و گزارش ویژگی‌های بالینی این سردردها و مقایسه آنها با هم، با معیار IHS (International Headache Society) انجام شده است.

روش کار

این پژوهش به روش مقطعی (Cross-sectional) روی ۱۱۵۰ بیمار مراجعه‌کننده با شکایت سردد به بیمارستان تخصصی فارابی، طی سال ۹۰-۱۳۸۹ در شهر کرمانشاه انجام شد. از بین آنها، مواردی که سردردشان بهدلیل بیماری‌های مغزی، داخلی و سیستمیک، به طور عمده شامل بیماری‌های کلیوی، کبدی، غدد

دارد (۱۱، ۱۰). سردد در ۸۰٪ مبتلایان به سردد تنشی، باعث اختلال در فعالیت طبیعی زندگی می‌شود، به طوری که در ۶۰٪ آنان توانایی کارکردن یا فعالیت‌های دیگر کاهش می‌یابد (۱۲). این نوع سردد در زنان شایع‌تر است و میزان شیوع آن از ۲۸ تا ۳۸ درصد در مردان و ۳۴ تا ۸۶ درصد در زنان متفاوت است (۱۲، ۱۳). سن شروع سردردهای تنشی نوجوانی و بیشترین شیوع آن در سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی است (۱۲، ۱۴). اما سردردهای میگرنی، با وجود شیوع کمتر نسبت به سردردهای تنشی، دارای شدت بیشتر و قدرت ناتوان کنندگی بالاتری‌اند و موجب اختلال در سیستم خودکار بدن می‌شوند (۱۵). این نوع از سردد که به صورت یک‌طرفه و اغلب ضربان‌دار، ظاهر می‌یابد و عموماً شامل سردد، تهوع، استفراغ و دیگر نشانه‌های اختلال کارکرد عصبی است (۱۶)، در آغاز، به صورت دوره‌ای و مرتبط با تنفس است، ولی می‌تواند در شکل مزمن، تقریباً روزانه، رخ دهد (۱۷). فراوانی جهانی این سندروم در مردان ۶-۴ درصد، در زنان ۱۶-۱۲ درصد (۱۸) و در مجموع، ۱۵-۱۲ درصد است (۱۵). استعداد ابتلای خانوادگی در پیدایش این بیماری نقش دارد، هیچ‌گونه محدودیت اجتماعی، اقتصادی یا نژادی برای آن وجود ندارد و شروع آن می‌تواند از هر سنی باشد (۱۹، ۲۰).

شیوع سردد در جوامع مختلف، متفاوت است، به طوری که در نروژ، برباد، ترکیه، قطر، عربستان، یوگسلاوی و کنیا، به ترتیب، ۷۶/۸٪، ۷۶/۸٪، ۸۲/۹٪، ۴۹/۲٪، ۴۹/۸٪، ۸۵٪ و ۸۸٪/۶۶٪ گزارش شده است (۲۱-۲۷) و در تمام موارد، شیوع سردد در زنان بیشتر از مردان بوده است. شیوع سردد در کنیا ۸۷٪ بود که از این میزان، سردد میگرنی ۳۸٪، سردد تنشی ۵۰٪ و سردد طبقه‌بندی‌نشده ۱۲٪ را به خود اختصاص داده‌اند (۲۷). در عمان نیز، شیوع سردد ۸/۹۶٪ و شیوع میگرن و سردد تنشی هر کدام ۲/۱۲٪ گزارش شد که در زنان، شیوع سردد بالاتر از مردان بود (۲۸). سردد بر فعالیت‌های شغلی و اجتماعی افراد تأثیری به سزا دارد. در پژوهشی در کشور برباد، ۷/۱۲٪ افراد مبتلا به سردد، سردد خفیف و بدون محدودیت در کارکرد، ۹/۵٪ سردد شدید با محدودیت عملکرد قابل توجه در هر روز و ۳٪ سردد تحمل ناپذیر را گزارش کرده‌اند (۲۹). مطالعه تأثیر سردد بر کیفیت زندگی افراد در برباد نشان داد که ۷/۶۲٪ از افراد میگرنی هنگام حملاتشان کاهش عملکرد شغلی داشتند و این رقم در مبتلایان به سردد تنشی

سال، با ۵۸ نفر مبتلا (۲۳/۳٪)، شایع‌تر بود (جدول شماره ۱). به لحاظ ویژگی‌های بالینی، ۵۱ نفر (۴۳/۲٪) از مبتلایان به میگرن و ۱۰۷ نفر (۵۲/۷٪) از مبتلایان به سردرد تنشی، بیش از یک حمله در یک هفته داشتند. میانگین تعداد حمله‌ها در ماه و طول مدت سردرد در جدول شماره ۲ آمده است. سردرد نبض دار در ۱۰۱ نفر (۸۵/۶٪) از مبتلایان به میگرن و ۸۴ نفر (۴۱/۳٪) از مبتلایان به سردرد تنشی مشاهده شد.

سردرد یک‌طرفه، به ترتیب در ۵۸ نفر (۴۹/۱٪) و ۲۵ نفر (۲۱/۲٪) از مبتلایان به سردرد میگرنی و سردرد دوطرفه، به ترتیب در ۹۸ نفر (۴۸/۳٪) و ۳۲ نفر (۱۵/۷٪) از مبتلایان به سردرد تنشی، و همچنین، سردرد دوطرفه در ۹ نفر (۳/۱٪) از مبتلایان به سردرد توأم میگرنی-تنشی دیده شد و رابطه‌ای معنادار بین موقعیت سردرد و نوع سردرد مشاهده شد ($P=0.0001$). (جدول شماره ۳).

تهوع (۴۴/۱٪) و بی‌اشتهايی (۲۸/۸٪)، به ترتیب نخستین و دومین نشانه مرتبه با سردرد میگرنی بودند. استفراغ، ترس از نور و ترس از صوت نیز، به ترتیب در (۱۳/۶٪)، (۷/۷٪) و (۵/۸٪) از مبتلایان به میگرن مشاهده شد (جدول شماره ۴).

(۷/۲٪) از مبتلایان به میگرن و (۴۰٪) از مبتلایان به سردرد تنشی دارای سردرد شدید بودند و بین شدت سردرد و نوع سردرد رابطه‌ای معنادار مشاهده شد ($P=0.0001$). (۲۰/۴٪) از مبتلایان به میگرن و (۸/۹٪) از مبتلایان به سردرد تنشی، به علت سردرد، شغل خود را از دست داده بودند. بین سردرد تنشی و سابقه درگیری در شغل دوم رابطه‌ای معنادار وجود داشت ($P<0.026$). هرچند نسبت شناس میگرن و سردرد تنشی در بیماران با مشاغل آزاد، نسبت به گروه‌های کارمند و خانه‌دار بیشتر بود، اما رابطه‌ای معنادار بین سردرد و گروه‌های شغلی گفته شده دیده نشد ($P>0.05$)

داخلی و عفونی، از پژوهش خارج و کنار گذاشته شدند. همچنین، بیماران میگرنی که در ویزیت اولیه با تشخیص پزشک غیر نورولوژیست با احتمال سینوزیت درمان شده بودند، از مطالعه کنار گذاشته شدند و در پایان، ۳۵۰ نفر به عنوان بیمار سردردی تشخیص داده شدند. گرفتن شرح حال به وسیله پزشک مرکز انجام شد و در صورت لزوم، از روش‌های تصویربرداری مغزی، تست‌های آزمایشگاهی یا مشاوره با متخصصان مختلف رشتۀ‌های پزشکی، برای تأیید تشخیص علل سردرد استفاده شد. علل سردرد با توجه به تقسیم‌بندی انجمن بین‌المللی سردرد IHS تعیین شدند. برای هر بیمار پرونده‌ای شامل اطلاعاتی در مورد سن، جنس، شغل (با دسته‌بندی مشاغل آزاد، کارمند، خانه‌دار(برای زنان بیمار)) تشکیل شد. تشخیص اولیه سردرد از سوی نخستین پزشک معالج (غیرنورولوژیست) و تشخیص نهایی سردرد از سوی نورولوژیست، براساس معیارهای IHS، داده شد. به عبارت دقیق‌تر، ملاک تشخیص سردرد، نظر نهایی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژیست)، در کنار معیارهای IHS بود. برای رعایت ملاحظات اخلاقی، پس از کسب رضایت‌نامه از بیماران و دادن آگاهی‌های لازم، به آن‌ها اطمینان داده شد که از اطلاعات دریافت‌شده فقط در پژوهش حاضر استفاده خواهد شد. در پایان نیز، داده‌های جمع‌آوری شده با نرم‌افزار آماری SPSS16 و با شاخص‌های فراوانی و درصد، تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها

از بین ۱۱۵۰ بیمار مراجعه‌کننده با شکایت سردرد به بیمارستان تخصصی فارابی شهر کرمانشاه، ۳۵۰ نفر (۳۰/۴٪) به عنوان بیمار دارای سردرد تشخیص‌گذاری شدند. با استفاده از معیار IHS و معاینه‌های بالینی تشخیصی، ۱۱۸ نفر (۱۰/۲٪) سردرد میگرنی، ۲۰۳ نفر (۱۷/۶٪) سردرد تنشی و ۲۹ نفر (۲/۲٪) سردرد توأم میگرنی-تنشی داشتند. براساس نتایج به دست آمده، شناس ابتلا به سردرد زنان، نسبت به مردان، بیشتر بود ($P<0.0001$). میگرن در گروه‌های سنی ۳۰-۴۱ سال، با ۵۴ نفر مبتلا (۴/۱۵٪)، بیشتر شیوع داشت، اما سردرد تنشی در گروه‌های سنی ۴۲-۵۳

جدول شماره ۱- برآوردهای شیوع سردد بین بیماران مراجعه‌کننده، بر حسب سن، جنس و گروه شغلی

سن (سال)	تعداد کل نمونه	تعداد نمونه با سردد	سردد میگرنی (%)	سردد تنشی (%)	سردد توأم میگرنی - تنشی (%)
مجموع					
۱۸-۲۹	۴۵۹	۱۱۷	۴۰	۷۲	(۱۵/۷) ۵
۳۰-۴۱	۳۵۲	۱۲۹	۵۴	۶۳	(۱۷/۹) ۱۲
۴۲-۵۳	۲۴۹	۸۳	۱۶	۵۸	(۲۳/۳) ۹
۵۴-۶۵	۹۰	۲۱	۸	۱۰	(۱۱/۱) ۳
حدود اطمینان٪	۱۱۵۰	۳۵۰	۱۱۸	۲۰۳	(۱۷/۶) ۲۹
P-Value	-	-	P<0.005	P<0.024	P=0.104
جنسیت					
مرد	۳۴۹	۶۹	۱۹	۴۵	(۱۲/۹) ۵
زن	۸۰۱	۲۸۱	۹۷	۱۵۴	(۱۹/۳) ۳۰
P-Value	-	-	P<0.001	P<0.001	P<0.003
نوع اشتغال					
آزاد	۵۹۲	۲۱۴	۲۲	۱۱۸	(۱۹/۸) ۲۴
کارمند	۲۶۱	۶۷	۱۸	۴۳	(۱۶/۵) ۶
خانهدار	۲۹۷	۶۹	۲۵	۳۸	(۱۲/۸) ۶
P-Value	-	-	P=0.382	P<0.002	P=0.067

جدول شماره ۲- میانگین (انحراف معیار) تعداد حمله‌هادر ماه و طول مدت سردد در بیماران مراجعه‌کننده با شکایت سردد

نوع سردد	جنسيت	میانگین انحراف معیار	میانگین انحراف معیار	تعداد حمله‌هادر ماه	طول مدت هر سردد (ساعت)
سردد میگرنی	زن	۶/۱	۶/۲	۶/۲	۱۶/۵
مرد	۵/۹	۵	۱۶/۸	۱۶/۸	۲۱/۹
سردد تنشی	زن	۷/۵	۶/۸	۷/۵	۱۲
مرد	۶	۶/۲	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۸/۵
سردد توأم میگرنی- تنشی	زن	۹/۳	۸/۷	۸/۷	۱۷
مرد	۹	۷/۱	۱۷/۹	۷/۱	۱۹/۱

جدول شماره ۳- موقعیت سردردهای میگرنی و تنشی

نوع سردد	یک طرفه	دو طرفه	پشت سر	جلوی سر	تمام سر	دیگر موارد
فراآوانی(درصد)						
سردد میگرنی	(۴۹/۱)۵۸	(۲۱/۲)۲۵	(۱۲/۷)۱۵	(۳/۴)۴	(۱۰/۱)۱۲	(۳/۴)۴
سردد تنشی	(۱۰/۳)۲۱	(۴۸/۳)۹۸	(۱۵/۷)۳۲	(۱۳/۳)۲۷	(۸/۹)۱۸	(۳/۵)۷
سردد توأم میگرنی- تنشی	(۱۳/۸)۴	(۳۱)۹	(۱۰/۳)۳	(۱۰/۳)۳	(۱۳/۸)۴	(۲۰/۷)۶
مجموع	(۲۳/۷)۸۳	(۳۷/۷)۱۳۲	(۱۴/۳)۵۰	(۹/۷)۳۴	(۷/۴)۲۶	(۷/۱)۲۵

جدول شماره ۴- نشانه‌های همراه با سردرد

ترس از نور		تپوه		ترس از صوت		استفراغ		بی‌اشتهایی		نوع سردرد	
فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد
۷/۷	۹	۴۴/۱	۵۲	۵/۸	۷	۱۳/۶	۱۶	۲۸/۸	۳۴	سردرد میگرنی	
۷/۸	۱۶	۳۷/۵	۷۶	۲۰/۲	۴۱	۷/۸	۱۶	۲۶/۶	۵۴	سردرد تنشی	
۱۷/۳	۵	۴۱/۴	۱۲	۶/۸	۲	۶/۸	۲	۲۷/۶	۸	سردرد توأم میگرنی- تنشی	
۵/۷۰	۳۰	۴۰	۱۴۰	۱۴/۳	۵۰	۹/۷	۳۴	۲۷/۵	۹۶	مجموع	

نتایج پژوهش Dahlöf و معیار IHS همخوانی دارد (۴۰). در (۵۵/۹٪) از مبتلایان به سردرد میگرنی، نشانه‌های همراه با سردرد (استفراغ، بی‌اشتهایی، ترس از صوت و نور) مشاهده شد که با نتایج پژوهش‌های پیشین و معیارهای IHS همخوانی داشت (۴۱)، اما از پژوهشی که در کره توسط Roh صورت گرفت، پایین‌تر بود (۳۸). در پژوهش حاضر، رابطه‌ای معنادار از لحاظ شدت سردرد بین سردرد میگرنی و سردرد تنشی مشاهده شد که با پژوهش Iniguez همخوان بود (۴۲). برآورد شدت سردرد در برآورد بار میگرن روی افراد و جامعه نقشی کلیدی دارد. همچنین، اندازه‌گیری شدت سردرد می‌تواند در پیش‌بینی ناتوانی مربوط و نیاز به تسهیلات بهداشتی و سلامتی دارای اهمیت باشد. این اندازه‌گیری همچنین، در شناسایی گروههای هدف، برای توجه و مراقبت‌های ویژه، بسیار مؤثر است (۳۳). همچنین در پژوهش حاضر، رابطه‌ای معنادار بین سردرد تنشی و سابقه درگیری در شغل دوم مشاهده شد ($P<0.026$) که با نتایج (۴۳) همخوانی دارد، اما رابطه‌ای معنادار بین گروههای شغلی و سردردها وجود نداشت ($P>0.05$) که این نتیجه، با نتایج پژوهش Zetola ناهمخوان بود (۴۴).

یافته دیگر پژوهش حاضر، بیانگر این بود که سردردهای تنشی و میگرنی دو عارضه جدالگانه‌اند و در ایجاد هریک، دیگری کاملاً بی‌تأثیر است. این یافته با نتایج پژوهش Iniguez و Ulrich همخوانی دارد (۴۵). این بیماری امروزه اقزوون بر عوارض جسمی، باعث کاهش کیفیت زندگی، از دست دادن زمان مفید کاری و کاهش بهره‌وری، غیبتهای مکرر شغلی و مصرف نابهنجای مسکن‌ها می‌شود و از دیگر سو، با توجه به این که سردردها غالباً در سنین تولید‌کنندگی و باروری اقتصادی (سردرد تنشی در نوجوانی و میگرنی، ۵۰-۲۰ سالگی) بروز می‌یابند (۱۲، ۱۴، ۴۶)، این امر توجه بیشتر و ارائه راهکارهایی را می‌طلبد.

بحث

پژوهش حاضر مطالعه‌ای بر پایه بررسی مراجعان با شکایت سردرد به بیمارستان تخصصی فارابی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۹-۹۰ است. معیار تشخیصی سردرد و غربالگری آن بر پایه معیار بین‌المللی سردرد IHS و تشخیص بالینی بهوسیله نورولوژیست بود. نتایج این پژوهش بیانگر شیوع بالاتر سردرد در زنان (۰/۸۰٪)، در مقایسه با مردان (۰/۱۹٪)، بود که با نتایج دیگر پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه، کاملاً همخوان بود (۲۱-۲۷). در پژوهش حاضر، شیوع میگرن (۰/۱۰٪) برآورد شد که با نتایج پژوهش‌های آیت‌الله‌ی بین آموزگاران مدارس ابتدایی شیراز (۰/۱۰٪) و PrysePh بین جمعیت عمومی کانادا (۰/۱۰٪) و همچنین، با نتایج پژوهش یوسفی که بین دانشجویان پزشکی زنجان (۰/۱۱٪) انجام شده‌است، همخوانی دارد (۳۵-۳۷). شیوع سردرد تنشی برآورده شده در پژوهش حاضر (۰/۱۷٪) و با نتایج پژوهش‌های JK Roh بین جمعیت عمومی کره (۰/۱۶٪) و Amango در پرتقال (۰/۱۶٪) و همچنین با نتایج پژوهش Koseoglu بین زنان ترکیه (۰/۱۸٪) همخوانی دارد (۳۸، ۳۹). شیوع سردردهای توأم میگرنی- تنشی (۰/۲۵٪) برآورد شده‌است که با نتایج پژوهش‌های انجام‌شده بین دانشجویان پزشکی شیراز (۰/۲۷٪) همخوان بود (۰/۳۳٪)، اما کمتر از نتیجه پژوهش انجام‌شده در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شیراز (۰/۰۵٪) و کره جنوبی (۰/۰۷٪) بود (۰/۳۸٪). در پژوهش حاضر، (۰/۴۹٪) از مبتلایان به میگرن، از سردرد یک‌طرفه، (۰/۴۸٪) از مبتلایان به سردرد تنشی، از سردرد دوطرفه و (۰/۳۱٪) از مبتلایان به سردرد توأم میگرنی- تنشی رنج می‌برندند. این نتایج، در مقایسه با برخی از پژوهش‌های پیشین، پایین بود (۰/۳۸، ۰/۴۰، ۰/۴۱). کیفیت ضربانی سردرد در (۰/۰۸۵٪) و به ترتیب در افراد میگرنی و تنشی مشاهده شد که با

IHS همخوانی داشت. مقایسه گزارش‌های ما با معیار IHS همخوانی بین این معیار و تشخیص نورولوژیست را نشان می‌دهد و این نتیجه‌گیری در واقع، می‌تواند اعتبار بالای این معیار را نشان دهد. یافته‌های مربوط به شدت سردرد و بهدنیال آن، از دست دادن کار به علت سردرد، در بازتاباندن اهمیت اثر اجتماعی میگرن و ضرورت ارائه راهکارهایی برای درمان و پیشگیری آن، بسیار مهم است. امیدواریم که نتایج حاصل از این مطالعه بتواند در توجه و ارائه راهکارهایی در این حوزه مفید واقع گردد. البته برای تأیید ویژگی‌های همه‌گیرشناسانه و بالینی سردرد در ایران، با توجه به تنوع استانی و همچنین تنوع خردمندگان، به مطالعه‌های بیشتر و جامع‌تر در دیگر نقاط کشور نیاز است.

تشکر و قدردانی

پژوهشگران از همکاری همه مسئولان و مراجعان محترم
شرکت‌کننده در این پژوهش، سپاسگزاری می‌کنند.

تا با کمک آن‌ها بتوان روندی مناسب را برای پیشگیری، تشخیص و درمان سردردها برگزید. این راهبردها می‌توانند با بررسی فراوانی توزیع، تشخیص عوامل خطر اولیه و درمان ارزیابی گردند و در مجموع، تشخیص و درمان مناسب افراد می‌تواند اثر سردرد روی افراد و بار سردرد روی جامعه را کاهش دهد (۷). برای نمونه، پژوهش DueLand و همکاران نشان داد که ۴۶٪ افراد مبتلا به سردرد حداقل یک روز غیبت از کار داشتند که میانگین غیبت از کار به‌دلیل میگرن، ۱۹٪ روز در عرض شش ماه بود. (۴۳). همچنین، مطالعه تأثیر سردرد بر کیفیت زندگی افراد در برزیل نشان داد که ۶۲٪ از افراد میگرنی هنگام حملاتشان کاهش عملکرد شغلی داشتند و این رقم در مورد سردرد تنشی ۴۵٪ بود (۳۰).

نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر، ویژگی‌های بالینی، مانند یک طرفه بودن سردرد، ضربه‌ای بودن سردرد، ترس از صوت و ترس از نور با معیار

منابع

1. Kurt S, Kaplan Y. Epidemiological and clinical characteristics of headache in university students. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2008; 110: 46-50.
2. Olesen JT, Peer H, Welsh K, Micheal A. The Headache. 2thed. Lipincottwilliams&Wilking Philadelphia, 2000; 1024-52.
3. GholamrezaMirzaei M. Prevalence of frequent migraines and loss of function in Shahrekord city high school students. Medical Journal of Shahrekord, 2004; 55-62.
4. Kachoei H, Amelly G, Sharifibonnab MM, Tavallaei SA, Keshavarzi N. Contributing factors in migraine attacks. Kowsar Medical Journal. 2009; 11: 279-84.
5. Evans RW, Evans J, Mathew NT, Rosenthal RC. Handbook of Headache. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000; 80-1.
6. Nemati V. Study of neurological complications - the psychological result of the war. Symposium Proceedings, Tehran: Tehran University of Medical Sciences Department of Psychiatry and Psychology, 2003.: 59-63.
7. Lipton RB, Stewart WF, Diamond S, Diamond ML, Reed M. Prevalence and burden of migraine in the United States: data from the American Migraine Study II. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2001; 41: 646-57.
8. Kernick D. An introduction to the basic principles of health economics for those involved in the development and delivery of headache care. Cephalgia, 2005; 25: 709-14.
9. Fumal A, Schoenen J. Tension-type headache: current research and clinical management. The Lancet Neurology. 2008; 1: 70-83.
10. Holroyd KA, O'Donnell FJ, Stensland M, Lipchik MG, Cordingley GE, Carlson BW. Management of Chronic Tension-Type Headache With Tricyclic Antidepressant Medication, Stress Management Therapy, and Their CombinationA Randomized Controlled Trial. The Journal of American Medical Association. 2001; 285: 2208-2215.
11. Ndryvly T. Sicily Principles of Internal Medicine: Infectious Diseases. Translated by Arjomand M, et al. Tehran: Publications Arjomand. 2010. 264-9.
12. Silberstein SD, Lipton RB, Goadsby P. Headache in clinical practice. London and York: Martin Dunitz, 2002. 11-30.
13. Stone RG, Wharton RB. Simultaneous multiple modality therapy for tension headaches and neck pain. Biomedical Instrumentation & Technology, 1997; 31: 259-62.
14. Black JM, Matassarin Jacobs E. Medical surgical nursing. Philadelphia:W.B.saunders;1997. 5thed. 820.
15. Delsing J, Tfelt-Hansen P, Welch, Michael A: The Headaches. 2nded. Philadelphia, Lippincott, Williams and Wilkins, 2000. 22.
16. Kasper DL, Harrison S. Principle of internal medicine. New York: McGraw-Hill publishing. 2005, 110-23.
17. Penzien DB, Andrasik F, Freidenberg BM, Houle TT, Lake AE, Lipchik GL, et al. Guidelines for trials of behavioral treatments for recurrent headache, (1st. ed.). American Headache Society behavioral clinical trials workgroup.Headache, 45(Suppl 2), 2006, 110- 32.
18. Raymond DA, Allan HR. Adams Principles of Neurology. 8th ed. New York: McGraw Hill. 2005; 147.
19. Adams RD. Headache and other craniofacial pains. In: Adams and Victor's. Principles of neurology. From McGraw Hill Company. NewYork: USA, 2011; 181-3.
20. Lipton RB, Stewart WF. Prevalence and impact of migraine. Neurologic Clinics,1997;15: 1-13.
21. Zwart JA, Dyb G, Holmen TL, Stovner LJ, Sand T. The prevalence of migraine and tension-type headache among adolescents in Norway. The Nord-Trondelag Health Study (Head-HUNT-Youth), Large population based epidemiological study. Cephalgia. 2004; 24: 373-9.
22. Barea LM, Rotta NT, Stein A, Barros HM, Tannhauser M. Analgesic use for headache treatment by schoolchildren of southern Brazil. Pharmacopidemiol Drug saf. 1997;6: 359-66.
23. Bugdayci R, Ozge A, Sasmz T, Kurt AO, Kaleagasi H, Karakelle A, Tezcan H, Siva A. Prevalence and factors

- affecting headache in Turkish schoolchildren. *Pediatrics International*. 2005; 3: 316-22.
24. Bessisso MS, Bener A, Elsiad MF, AL-khalaf FA, Huzaima KA. Patter of Hedache in School children in the state of Qatar. *Saudi medical journal*. 2005; 26: 566-70.
 25. Al Jumah M, Awade A, AL Azzam S. Headache syndroms amongst school children in Riyadh, Saudi Arabi. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*.2002; 42: 281-6.
 26. Dzoljic E, Sipetic S, Vlajinac H, Marinkovic J, Brzakovic B, Pokrajac M, Kostic V. Prevalence of menstrually related migraine and nonmigraine primary headache in female students of Belgrade University. *Headache*, 2002; 42: 185-93.
 27. AmagoEo, Jowijo, Njern EK. Migraine headache in a group of medical students at the Kenyatta National Hospital, Nairobi. *East African Medical Journal*. 1996; 73: 594-7.
 28. Dleu D, Khan MA, Humadian H, AL Mantheri Z, AL Hashami S. Prevalence and clinical characteristics of Headache in Medical Students in Oman. *Headache*. 2001; 41: 798-804.
 29. Da Costa Mz, Sorares CB, Heinish LM, Heinisch RH. Frequency of Headache in medical students of Santa Catrina,s Federal university. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*. 2000; 40: 740-44.
 30. Bigal ME, Bigal JM, Betti M, Bordini CA, Specialel JG. Evaluation of the impact of Migraine and episodic Tension-type headache on the quality of life and performance of a university student population. *Headache*. 2001; 41: 710-9.
 31. Amango EO, Jorri JO, Njeru EK. Headache Associated disability in medical students at the konyatta National Hospital, Nairobi. *East African Medical Journal*.2002; 79: 519-23.
 32. Valjinac H, Dzoljic E, Sipetic S, Kostic V. Hereditary pattens of Belgrad university female students with migraine and nonmigraine primary headache. *Journal of neurology*. 2004; 251: 973-6.
 33. Ayatollahi SM, DarabzandT,SheibaniF. Tension headaches and migraine prevalence in Shiraz University of Medical Sciences. *Journal of Kerman University of Medical Sciences*. 2000; 6: 141-48.
 34. Ayatollahi SM, KhosraviA.Case - control study of factors influencing migraine and tension headaches among school children in Shiraz. *Journal of Medical Sciences and Health Services - Health, Hamadan*, 2004; 11: 42-37.
 35. Ayatollahi SM, Chraghyan B. Epidemiologic patterns of tension and migraine Khtrsrdhay elementary school teachers of Shiraz, 1381-82 school year. *Journal of Kerman University of Medical Sciences*, 2005; 6: 92-85.
 36. Yousefi M. Prevalence of migraine in medical students and doctors, Zanjan University of Medical Sciences, Medical Sciences – Zanjan. 1999; 24-18.
 37. Pryse-Phillips W, Findlay H, Tugwell P, Edmeads J, Murray TJ, Nelson RF. A Canadian population survey on the clinical, epidemiologic and societal impact of migraine and tension-type headache. *The Canasian Journal of neurological sciences*.2000; 19: 333-9.
 38. Roh JK, Kim JS, Ahn YO. Epidemiologic and clinical characteristics of Migraine and Tensiontype headache in Korea. *Headache*. 2008; 38: 356-65.
 39. Koseoglu E, Nacar M, Talaslioglu A, Cetinkaya F. Epidemiological and clinical characteristics of Migraine and Tension type headache in 1146 females in Kayseri, Turkey. *Cephalgia*. 2003; 23: 381-8.
 40. Dahlof C, Linde M. One-year prevalence of Migraine in Sweden: a population-based study in adults. *Cephalalgia*. 2001; 21: 664-71.
 41. Piovesan EJ, Kowacs PA, Lange MC, Pacheco C, Piovesan LR, Werneck LC. Prevalence and semiologic aspects of the idiopathic stabbing headache in a Migraine population. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*. 2009; 59: 201-5.
 42. Iniguez C, Larrode P, Mauri JA, Morales F. Clinical features of daily chronic headache. *Revista de Neurologia*.1997; 25: 1034-7.
 43. Find all citations in this journal (default).Or filter your current search 43. DueLand AN, Leira R, Burke TA, Hillger EV, Bolge S. The impact of migraine on work, family, and Leisure among young women-a multinational study. *Current Medical Research and Opinion*. 2004; 20: 159-69.
 44. Zetola VH, Novak EM, Luiz A, Branco BO, Sato BK, Nita CS, Bubna MH, Prado Rde A, Werneck LC. Headache incidence in a hospital community. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*.1998; 56: 559-64.
 45. Portela LF, Rotenberg L, Waissmann W. Self-reported health and sleep complaints among nursing personnel working under 12 h night and day shifts. *Current Medical Research and Opinion*. 2004; 21: 859-70.
 46. Rabins JC, Penzien DB, McCrory DC, Gray RN. Behavioral headache treatment: history, review of the empirical literature, and methodological critique. *journal of Headache*.2008; 45: 92-109

The Epidemiology and Clinical Characteristics of Migraine and Tension Headaches among the Patients Referred to Farabi Hospital in Kermanshah City in Year 2011

Behrouz B¹, Amini K², Farhnaz shakhniya³, Abedi A⁴, Ghasemi N⁵

1- Master Student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

2- PhD, Neurologist, Department of Neurology, University of Medicine and Health Sciences Kermanshah, Kermanshah, Iran

3- Master Student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

4- PhD, Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

5- PhD, Student of educational sciences, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

Corresponding author: Behrouz B., Behrouz.psych64@yahoo.com

Background & Objectives: Peavalu on sage sümpтом, mis võib olla tõsine problem iga inimese igas vanuserühmas. Several studies have shown that the prevalence of migraine and tension-type headache (TTH) varied between different geographical regions. Since there is little known about this in the country the current research has been conducted with the aim of estimating the prevalence of these types of migraines, reporting and comparing their clinical characteristics in this region of Iran.

Methods: This study conducted on 1150 admitted patients by first diagnosis of headache in Farabi hospital in Kermanshah during a period of one year from 2010 till 2011. Case definition was based on International Classification of Headache Disorders (ICHD) criteria. Among these, 350 patients were diagnosed as headache patients and completed the International Headache Schedule form. Data were analyzed by the use of descriptive frequency and percentage SPSS 16 software.

Results: The results indicate that women were stricken more than men by headache ($P<0.0001$). Migraine was more prevalent in the age groups of 30-41 that included 54 individual (15.4%). the tension headache was more common among the age group of 42-53 that constitute 58 people (%23.3) of the participants. A significant correlation was also reported between the position and type of the headache ($P<0.0001$). Findings of this research showed that 20.4% of people with migraine and nearly 9 percent (9%) of persons with tension headaches have lost their job because of their headaches. There is meaningful relation between tension headaches and experience into their second job struggling ($P<0.026$).

Conclusion: It is concluded that migraine and tension headaches seem two separate diseases and none of them has any effect on the other. Headache requires more attention and it should be, diagnosed and managed appropriately.

Keywords: Tension headache, Migraine headache, Patients referred Farabi Hospital